

Dans quelles conditions dois-je faire ma prise de sang ?

Consignes :

À faire à jeun sauf symptômes importants

(il est possible de prendre son traitement pour la thyroïde avant mais il ne faut pas prendre d'apports calciques avant)

Si possible toujours faire sa prise de sang dans le **même laboratoire**

TOUS LES 6 MOIS

Une analyse sanguine est recommandée pour le suivi de l'hypoparathyroïdie au moins deux fois par an.

Voici un exemple d'ordonnance pour la biologie de suivi à faire tous les 6 mois (qui comporte les urines des 24 heures et la mesure de la vitamine D)

N'oubliez pas de contrôler la TSH si nécessaire !

Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste)
(AFFECTION EXONERANTE)

18/04/2025

IMPORTANT ! Résultats à apporter impérativement le jour de la consultation

Iono sanguin , Calcium , Bicarbonate veineux , Protidémie , Créatininémie , Phosphore , Magnésium ,

Bilan
TSH ultra sensible ,

Bilan Phosphocalcique
Vitamine 25 OH D (remboursable, pathologie phosphocalcique)

Urines des 24h
Créatinine , Calcium , Sodium ,

Consignes
tous les 6 mois pendant 1 an

En cas de symptômes ou de changement de traitement

- **En cas de symptômes** d'hypocalcémie ou d'hypercalcémie

(soif intense, mal de tête, nausées)

- Après **modification du traitement**

En l'absence de symptôme, il peut être utile d'attendre au moins 10 jours avant de reconstrôler, pour l'équilibre du nouveau traitement. Demandez à votre médecin !

*Même ordonnance
valable **autant de fois**
que nécessaire !*

Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste)
(AFFECTION EXONERANTE)

12/03/2025

IMPORTANT ! Résultats à apporter impérativement le jour de la consultation

Iono sanguin , Calcium , Créatininémie , Phosphore , Magnésium ,

Consignes
à faire si symptômes d'hypocalcémie, valable autant de fois que nécessaire pendant 1 an